

โรคของปลานิล

โรคที่เกิดจากปรสิต



เห็บระฆัง

เห็บระฆังอาการ : ปลาไม่ค่อยกินอาหาร พลิกตัวไปมาว่ายน้ำทุรนทุรายและใช้ลำตัวสีผนังบ่อเพื่อให้ปรสิตหลุดออก

การรักษา : ใช้ฟอร์มาลิน 25 - 50 ซีซี ต่อน้ำ 1,000 ลิตร



ปลิงใส

ปลิงใสอาการ : ตัวปลาสีเข้มกว่าปกติ กินอาหารน้อยลง เหงือกบวมอักเสบ

การรักษา : ใช้ฟอร์มาลิน 25 - 50 ซีซี ต่อน้ำ 1,000 ลิตร



หมัดปลา

หมัดปลาอาการ : ว่ายน้ำทุรนทุรายกระโดดขึ้นผิวน้ำ หากระบาดมากจะทำให้ปลาตายได้

การรักษา : แช่ไตรโคลฟอน สัปดาห์ละครั้งติดต่อกัน 3 - 4 สัปดาห์



เห็บปลา

เห็บปลาอาการ : ปลาเกิดแผล ตกเลือดว่ายน้ำทุรนทุรายและใช้ลำตัวสีผนังบ่อให้ปรสิตหลุดออก

การรักษา : แช่ปลาในสารละลายยาฆ่าแมลงไตรโคลฟอน 0.5 - 1.75 กรัม ต่อน้ำ

1,000 ลิตรหรือดีพเทอร์เร็กซ์ 0.25 - 0.5 กรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตร แต่ต้องระวังไม่ใช้สารเคมีกับปลาในระยะใกล้จับเพราะอาจปนเปื้อนในเนื้อปลา

โรคติดเชื้อแบคทีเรียมักจะเป็นการติดเชื้อภายในต้องรักษาด้วยอาหารผสมยาปฏิชีวนะ ปลาที่ติดเชื้อโดยทั่วไปมีการตกเลือดหรือเป็นแผลบริเวณลำตัว รอบตาและปาก ท้องบวม ตาโปน

กลุ่มยาที่ใช้รักษาโรค

1) ออกซิเตตราซัยคลิน

3) ออกโซลิโนนิกแอซิด


2) เทตราซัยคลิน

4) ซัลฟาเมทท็อกซิน



โรคของปลานิล

โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย



โรคจากการติดเชื้อแอโรโมแนส

มักพบบ่อยในปลาที่เลี้ยงโดยให้อาหารสดหรือการเลี้ยงแบบผสมผสาน เชื้อนี้อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีปริมาณสารอินทรีย์สูง

อาการ : ปลาไม่กินอาหาร ว่ายน้ำเฉื่อยชา ครีบคร่อน ตกเลือด เกิดบาดแผลเป็นหลุม ท้องบวม



โรคเหงือกเน่าในปลานิล

การระบาดของโรคมักจะเกิดขึ้นกับปลาที่เลี้ยงหนาแน่นมาก ปลาที่เลี้ยงในที่มือออกซิเจนในน้ำต่ำหรืออุณหภูมิขึ้นๆลงๆโดยเฉพาะหลังจากฝนตกใหม่ ๆ ทำให้ปลาปรับสภาพไม่ทัน


อาการ : ภายนอกของปลาที่ติดเชื้อแบคทีเรีย ปลาโหวแบคทีเรียมีลักษณะตัวต่าง เหงือกเน่า ดูลำไส้กับมีเศษตะกอนดินโคลนติดอยู่



โรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส

มักจะระบาดรุนแรงในหน้าร้อน หากติดเชื้อรุนแรงปลาจะตายจำนวนมาก

อาการ : ตาขุ่นขาวว่ายน้ำช้า ลอยตัวนิ่ง บริเวณช่องขั้วถ่ายบวมแดง



โรคคอลัมน์าริส

โรครบาดในหน้าร้อนและช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

อาการ : ตัวปลาสีซีดต่างเป็นแถบๆ มีเมือกมากผิดปกติครีบและเหงือกคร่อน

คำแนะนำโรคติดเชื้อแบคทีเรียมักจะเป็นการติดเชื้อภายในต้องรักษาด้วยอาหารผสมยาปฏิชีวนะ ปลาที่ติดเชื้อโดยทั่วไปมีการตกเลือดหรือเป็นแผลบริเวณลำตัว รอบตาและปาก ท้องบวม ตาโปน

- 1) ควรใช้ยาติดต่อกัน 5 - 14 วันแล้วแต่ชนิดของยา
- 2) ควรหยุดใช้ยาอย่างน้อย 21 วัน ก่อนจับขายเพื่อไม่ให้ยาตกค้างในตัวปลา
- 3) ปลาที่เป็นโรคคอลัมน์าริส จะตัวต่าง อาจรักษาโดยการให้ยาเหลือง แขนในอัตราความเข้มข้น 1 - 3 มิลลิกรัมต่อลิตร

